

سازارین چیست؟

سازارین روشنی است که نوزاد از طریق یک برش جراحی که بر روی شکم و رحم مادر داده می شود متولد می گردد.

مهم ترین علتهایی که مادر باید سازارین شود عبارتند از :

* سابقه سازارین قبلی

* تنگی لگن یا عدم تناسب سر جنین با لگن مادر

* عدم پیشرفت زایمانی

* وضعیت نایجای جنین یا قرار گرفتن نامناسب

* جنین در رحم مادر

* حاملگی چند قلویی

* برولاپس بند ناف

* زجر جنین

* دیابت یا فشار خون بالای مادر

* جفت سر راهی

بنابراین سازارین فقط و فقط زمانیکه مادر یا جنین مشکل جدی دارند انجام می شود و برای یک مادر سالم با جنین سالم بهترین و سالمترین روش زایمانی طبیعی می باشد.

مراقبتها بعد از عمل :

بعد از عمل شما باید سرفه های موثر داشته باشید ، بنابراین با گذاشتن دست بر روی بخیه ها و فشار مختصری به آنها ابتداء نفس عمیق بکشید و سپس سرفه نمایید این عمل را چند بار در روز انجام دهید.

* در تخت پاهای خود را مرتبآ حرکت دهید تا از لخته شدن خون در رگها جلوگیری نمایید.

در صورت داشتن درد ابتداء سعی کنید با منحرف نمودن فکر و صحبت با دیگران و یا کشیدن نفس های عمیق و شل کردن عضلات از درد خود بکاهید و در صورتی که با این اقدامات درد شما کم نشد به پرستار مربوطه اطلاع دهید تا در صورت تجویز پزشک برای شما مسکن تزریق نماید.

* از استعمال پماد ، مواد چرب ، الکل ، بتادین و غیره بر روی ناحیه عمل و خط بخیه ها حتماً، خودداری نمایید و تنها با کمی کف صابون ناحیه عمل را هنگام استحمام شستشو دهید و آبکشی نمایید.

* از انجام پانسمان غیر بهداشتی روی ناحیه عمل خوداری نمایید.

* در صورت خونریزی شدید حتماً به پزشک یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

* به کلیه علایم عفونت از قبیل بالارفتن درجه حرارت ، ترشحات بدبو ، افزایش درد ، قرمزی و تورم محل عمل توجه کنید و در صورت مشاهده هر یک از علائم سریعاً به پزشک یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

* ۷-۱۰ روز بعد از عمل سازارین جهت معاینه و کشیدن بخیه ها به پزشک یا نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

* روز دهم غسل نفاس انجام دهید.

* از خوردن غذاهای نفاخ مثل حبوبات و غیره پرهیزید و سعی کنید بیشتر از مایعات و غذاهای پر فیر مثل سبزیجات ، میوه های تازه ، گوشت و استفاده نمایید. این نوع رژیم از بیوست و فشار آمدن به بخیه ها پیشگیری میکند.

* تداوم شیردهی ۱۲تا ۸ بار در روز به بازگشت اندام به فرم اولیه کمک میکند.

* ورزش های شکم را از هفته دوم بعد از عمل بصورت آرام شروع نمایید.

* تا ۴ روز بعد از عمل از فعالیت جنسی ، کارهای سنگین و ورزش های سنگین خوداری نمایید.

* بعد از ۴ روز از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری بمدت ۳ سال استفاده نمایید. زیرا حاملگی با فاصله نزدیک فشار روحی و جسمی به مادر وارد میکند و در ضمن مادر از نظر قوای جسمی و نخانه بدنی مثل آهن و کلسیم هنوز تامین نشده است.

* پس از خارج کردن سند توسط پرستار حتماً با اینکه درد دارید ادرار نمایید.

* راه رفتن برای کاهش درد ناشی از تجمع گاز و کاهش شانس عوارض تنفسی و حرکتی بسیار مؤثر می باشد.

* در صورت تجمع گاز در شکم (نفح) و بیوست لازم است ابتدا بیشتر حرکت نمایید و اگر مؤثر نبود پرستار را مطلع نمایید بدون اطلاع پزشک از داروهای ملین استفاده نکنید. حوله گرم روی شکم قرار دهید عرق نفنا استفاده کنید.

* مطمئن باشید که با تکان خوردن در بستر به بخیه شما صدمه ای نمی رسد.

* هنگام حرکت ، سرفه کردن ، خندیدن و تنفس عمیق محل جراحی را با دست محافظت کنید.

* احساس خستگی و خواب آلودگی احتمالی شما بخاطر داروی بیمهوشی می باشد نگران نباشید.

* حتماً هرجه سریعتر به فرزند خود شیر دهید از همراه و پرستار بخش کمک بخواهید.

مراقبتها که باید پس از ترخیص در منزل انجام شود :

* داروهایی را که پزشک متخصص تجویز نموده مصرف نمایید.

* جهت مصرف صحیح داروها از مسئول داروخانه یا پرستار خود راهنمایی بخواهید.

* برای پیشگیری از سردرد که از عوارض احتمالی بی حسی موضعی می باشد تا یک هفته روزی ۱۵ لیوان مایعات بنوشید. سر خود را زیاد تکان ندهید. تا دو روز از بالش استفاده نکنید و تخت بخوابید.

* بعد از ترخیص میتوانید از دوش گرم استفاده کنید.

* در هنگام استحمام بهتر است به صورت سریاپی دوش بگیرید و از نشستن به مدت طولانی پرهیز نمایید.

* از قرص آهن و مولتی ویتامین تا ۳ ماه بعد از عمل استفاده نمایید.

توصیه جهت مراقبت از نوزاد

* نوزاد را قبل از ترخیص از بیمارستان واکسینه کنید.
* جهت انجام تست شنوایی سنجی بلا فاصله بعد از ترخیص به مرکز شنوایی سنجی بیمارستان مراجعه نمایید.
* جهت گرفتن شناسنامه نوزاد با در دست داشتن کلیه مدارک پزشکی مادر و نوزاد و کارت ملی و شناسنامه والدین به نماینده ثبت احوال مستقر در بیمارستان فاطمیه مراجعه نمایید. (غیر از روزهای تعطیل رسمی)

* جهت انجام آزمایش های غربالگری نوزاد از روز سوم تا پنجم به نزدیکترین مرکز بهداشتی محل زندگی خود مراجعه نمایید.

* جهت پیشگیری از زردی، مکرر به نوزاد شیر مادر بدھید.
* روی بند ناف چیزی نگذارید، ظرف ۵ تا ۱۰ روز خود به خود سیاه شده و می افتد.

* شستشوی نوزاد را از جلو به عقب انجام دهید تا از عفونت ادراری پیشگیری شود.

مادر گرامی:

مراجعةه به مرکز بهداشتی - درمانی تحت پوشش در روزهای تعیین شده زیر جهت حفظ سلامت شما در دوران پس از زایمان ضرورت دارد :

- ۱- مراقبت بار اول : روزهای ۱-۳ بعد از زایمان (فرصت انجام این مراقبت تا ۷ روز پس از زایمان می باشد)
- ۲- مراقبت بار دوم : روزهای ۱۰-۱۵ بعد از زایمان (فرصت انجام این مراقبت تا ۲۸ روز پس از زایمان می باشد)
- ۳- مراقبت بار سوم : روزهای ۴۲-۶۰ بعد از زایمان

منبع:
ویلیامز ۲۰۱۴

عوارض سزارین و فواید زایمان طبیعی، معصومه کردی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

تلفن تماس : ۰۸۱-۳۸۲۷۷۰۱۲-۱۴

مدجوجی گرامی در صورت سوال در زمینه بیماری فعلی یا بروز هر گونه مشکل جهت راهنمایی های لازم شماره تلفن های ضروری بیمارستان در طی ۲۴ ساعت شبانه روز پاسخگو سوالات شما هستند.
صبح ها ساعت ۸-۱۴ داخلي ۲۵۶
عصر و شب و روزهای تعطیل: داخلی ۲۲۱ داخلي پاتولوژي: ۲۵۱

پست الکترونیکی بیمارستان فاطمیه
<http://fth.umsha.ac.ir>
hp.fatemieh@gmil.com
fax:38283939

توصیه های لازم در سزارین



پمفت آموزشی
شماره سند: TR-FO-۱۲-۱
شماره بازنگری: D

بهار: ۱۳۹۸
واحد آموزش دفترپرستاری



مرکز آموزشی، درمانی، پژوهشی
فاطمیه همدان